

Chemical Bonding

حاصلاتِ تعلیم:

اس باب میں آپ سیکھیں گے:

- نوبل گیس کی الیکٹرانک کنفیگریشن بیان کریں۔ نیز آکٹیٹ اور ڈپلٹ اصولوں (Octet and Duplet Rules) کی مدد سے عناصر کی خصوصیات کی پیش گوئی کیسے کی جاسکتی ہے اس کو بیان کریں۔
- مثبت آئن اور منفی آئن کی تشکیل کا موازنہ کریں۔
- میٹلز اور نان میٹلز کی الیکٹرو پوزیٹیو اور الیکٹرو نیگیٹیو نوعیت کا تعین کریں۔
- آئیونک (Ionic) کوویلنٹ (Covalent) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ (Coordinate Covalent) اور میٹلک بانڈ (Metallic bond) کی تعریف کریں۔
- (الف) آئیونک مرکبات اور کوویلنٹ مرکبات کا موازنہ کریں (مندرجہ ذیل نکات کو متعلقہ تعریفوں میں شامل کریں)
- (ب) آئیونک بانڈ مخالف چارج شدہ آئنز کے درمیان مضبوط الیکٹرو سٹیک کشش کے طور پر۔
- (ج) کوویلنٹ بانڈ مشترکہ الیکٹرانوں اور دونوں کلینس کے درمیان مضبوط الیکٹرو سٹیک کشش کے طور پر۔
- میٹلک بانڈ ڈی لوکلائزڈ (Delocalized) الیکٹرانوں اور مثبت چارج شدہ آئنز کے سمندر نما بادلوں کے درمیان مضبوط الیکٹرو سٹیک کشش کے طور پر۔
- بانڈنگ اور ساخت کے لحاظ سے مرکبات کی خصوصیات کی وضاحت کریں۔
- ایٹمز کے درمیان موجود کیمیکل بانڈ کی موجودگی سے میٹریلز کے خواص اور استعمالات میں جو فرق آتا ہے اس کا موازنہ کریں مثال کے طور پر ان کی طاقت (Strength) اور کنڈکٹیوٹی میں۔
- آئیونک کمپاؤنڈز اور کوویلنٹ کمپاؤنڈز میں باہمی کشش سے ان کے میلٹنگ پوائنٹس (Melting points) اور بوائیٹنگ پوائنٹس (Boiling points) پر پیدا ہونے والے اثرات کی تشریح کریں۔
- آئنی کمپاؤنڈز اور کوویلنٹ کمپاؤنڈ اور میٹلک بانڈز میں بجلی کی ترسیل کے لیے آزاد چارج شدہ ذرات (الیکٹرانز یا آئنز) کی دستیابی کا جواز پیش کریں۔ کہ پانی میں تحلیل ہونے پر کچھ مادے ایٹانز ہو سکتے ہیں۔ جیسے ایسڈز پانی میں تحلیل ہو کر بجلی کی ترسیل کا باعث بنتے ہیں۔
- صنعتی مقاصد کے لیے گریفائٹ، ہیرے اور دھاتوں کے استعمال کی مناسبت کا جواز پیش کریں۔ (مثال کے طور پر گریفائٹ بطور لیٹریکٹ اور الیکٹروڈ (ب) ہیرا بطور کانٹے والا اوزار (ج) تاروں اور چادروں کے لیے میٹلز)۔
- آئیونک اور کوویلنٹ کمپاؤنڈ اور ان سے متعلقہ آئنز کے سٹرکچرز لکھیں۔ مثال کے طور پر (a) NaF, NaBr اور Cl₂ جیسے دوائیٹرو والے کمپاؤنڈز میں موجود آئیونک بانڈز (b) کوویلنٹ کمپاؤنڈز مثلاً HCN, CO₂, C₂H₄, CH₃OH, HCl, NH₃, CH₄, H₂O، N₂, O₂, Cl₂, H₂ اور ان سے ملنے جلتے کمپاؤنڈز کے ڈاٹ اور کراس اور لیوس ڈاٹ سٹرکچرز لکھنا۔

انشائی طرز سوالات

محکمہ تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے انشائی طرز سوالات

3.1 ایٹمز کیوں کیمیکل بانڈ بناتے ہیں؟ (Why Atoms Forms Chemical Bond?)

3.2 کیمیکل بانڈ (Chemical Bond)

سوال 1: ایٹمز ٹھیلٹی حاصل کرنے کے لیے اپنی انرجی کو کیسے کم کرتے ہیں؟

جواب: اس دنیا میں موجود تمام ایٹمز اپنی انرجی کم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اس کوشش میں وہ دوسرے ایٹمز کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی امر ہے کیونکہ اس کی مدد سے ایٹمز کی ٹھیلٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔

تمام ایٹمز جو پیریاڈک ٹیبل میں موجود ہیں غیر مستحکم ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کے بیرونی شیل نامکمل ہوتے ہیں سوائے گروپ VIII-A کے ایلیمینٹس کے گروپ VIII-A کے ایلیمینٹس کے ویلنس شیل مکمل ہوتے ہیں اس لیے یہ دوسرے ایلیمینٹس کے ساتھ ملنے کا رجحان کم رکھتے ہیں۔ انہیں دوسرے ایلیمینٹس (نوبل گیسز کے علاوہ)، نوبل گیسز کی ترتیب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رجحان کیمیکل بانڈ کی ایک اہم بنیاد ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایٹم نان ری ایکٹیو گیس کی الیکٹرونک کنفیگریشن حاصل کرنے کے لیے کیمیکل بانڈ بناتے ہیں۔

سوال 2: ایٹمز اپنا ڈوپلیٹ یا آکٹیٹ کیسے مکمل کرتے ہیں؟ مثال سے واضح کریں۔

جواب: ایٹمز دوسرے ایٹمز سے اس لیے منسلک ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بیرونی شیلز میں دو یا آٹھ الیکٹرونز لے کر خود کو مستحکم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوڈیم کے ایٹم کے بیرونی شیل میں ایک الیکٹرون ہے اس ایٹم کے لیے استحکام حاصل کرنے کے لیے دو راستے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ اپنا ایک الیکٹرون کھودے، دوسرا یہ ہے کہ مزید سات الیکٹرونز جذب کر لے۔ ان دونوں طریقوں سے سوڈیم کے بیرونی شیل میں آٹھ الیکٹرونز آ جانے سے اس کا آکٹیٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً سوڈیم ایک ایسا آسان راستہ اختیار کرتا ہے اور اپنا ایک الیکٹرون کھو کر دوسرے ایٹم سے بانڈ بناتا ہے۔ اس طرح ہائیڈروجن ایٹم کے لیے یہ دونوں راستے آسان ہیں وہ چاہے تو اپنے بیرونی شیل میں ایک الیکٹرون کھو کر پروٹان (H^+) بنائے یا ایک الیکٹرون حاصل کر کے اپنا ڈوپلیٹ مکمل کرے۔

سوال 3: الیکٹرو پوزیٹو میٹلو اور الیکٹرو نیگیٹو میٹلو میں فرق کریں۔

جواب: پیریاڈک ٹیبل میں موجود الکی میٹلو (Alkali Metals) اور الکلائن ارتھ میٹلو (Alkaline Earth Metals) کے لیے یہ بات آسان ہے کہ وہ اپنے الیکٹرونز سولہویں اور سترہویں گروپس کو منتقل کر کے بانڈ بنائیں۔ الکی اور الکلائن ارتھ میٹلو چونکہ آسانی سے اپنے الیکٹرونز سے محروم ہو جاتی ہیں اس لیے ان کو الیکٹرو پوزیٹو میٹلو (Electropositive Metals) کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح سولہویں اور سترہویں گروپس کے ایلیمینٹس آسانی سے الیکٹرونز جذب کر لیتے ہیں اس لیے ان ایلیمینٹس کو الیکٹرو نیگیٹو میٹلو (Electronegative Metals) کا نام دیا گیا ہے۔

سوال 4: کیمیکل بانڈ کی تعریف لکھیں۔ کیمیکل بانڈ کی اقسام کے نام لکھیں۔

جواب: کیمیکل بانڈ: کیمیکل بانڈ کشش کی وہ قوت ہے جو ایٹمز کو الیکٹرول یا کمپاؤنڈ کی صورت میں باندھ کر رکھتی ہے۔

جب دو مختلف اشیاء کے ایٹمز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو دو باتیں ممکن ہو سکتی ہیں۔

i. آئیونک بانڈ (Ionic Bond) ii. کوویلنٹ بانڈ (Covalent Bond)

iii. کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ (Coordinate Covalent Bond)

سوال 5: کیمیکل بانڈ کی انرجی کس سے کیا مراد ہے؟

جواب: کیمیکل بانڈ کی انرجی کس: کیمیکل بانڈ کے دوران ان کے درمیان کشش کی قوتیں جنم لیں جبکہ دوسرا امکان اس بات کا ہے کہ ان کے درمیان دفع کی قوتیں پیدا ہوں۔ اگر کشش کی قوتیں دفع کی قوتوں سے زیادہ طاقتور ہوں گی تو منسلک ہونے والے دونوں ایٹمز کی انرجی کم ہوگی اور نتیجتاً وہ ایک دوسرے سے منسلک ہو کر نیا مالیکیول بنائیں گے۔ دوسری صورت میں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے۔



سوال 6: سوڈیم کلورائیڈ کی مثال سے آئیونک بانڈ بننے کی وضاحت کریں۔

جواب: آئیونک بانڈ: یہ کیمیکل بانڈ ایلیمنٹ کے ایٹمز کی اس خصوصیت کی وجہ سے وجود میں آتا ہے کہ وہ خود کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کوشش میں یہ ایٹمز اپنے بیرونی شیلز میں موجود الیکٹرونز کھودیتے ہیں یا پھر الیکٹرون یا الیکٹرونز جذب کر لیتے ہیں۔ دراصل یہ ایٹمز اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان کے بیرونی شیل میں موجود الیکٹرونز کی تعداد نزدیک ترین نوہل گیس جیسی ہو جائے تاکہ ان میں بھی نوہل گیس جیسا استحکام پیدا ہو جائے۔ سوڈیم کلورائیڈ میں آئیونک بانڈ اس وقت وجود میں آتا ہے جب سوڈیم اور کلورین کیمیکل ری ایکشن کرتے ہیں۔ ان کے الیکٹرونک کنفگوریشنز درج ذیل ہے۔

	پہلا شیل	دوسرا شیل	تیسرا شیل
$_{11}\text{Na}$	2	8	1
$_{17}\text{Cl}$	2	8	7

سوڈیم اور کلورین کی الیکٹرونک کنفگوریشنز

سوڈیم کے بیرونی شیل میں سے ایک الیکٹرون کلورین کے بیرونی شیل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح ان دونوں ایلیمنٹس کے الیکٹرونک کنفگوریشنز نزدیک ترین نوہل گیس جیسے ہو جاتے ہیں۔




سوڈیم سے ایک الیکٹرون کا کلورین میں منتقل ہوتا۔

اسی طرح سوڈیم، فلورین اور برومین سے ری ایکٹ کر کے بالترتیب سوڈیم فلورائیڈ اور سوڈیم برومائڈ بناتا ہے۔


منتقل ہونے والا الیکٹرون یا الیکٹرونز ہمیشہ ایٹم کے بیرونی شیل میں موجود ہوتا ہے یا ہوتے ہیں۔ اوپر دی گئی مثال میں بننے والے سوڈیم کلورائیڈ میں موجود سوڈیم اور کلورائیڈ آئنز کے درمیان الیکٹروستاتک کشش کی فورس (Electrostatic Force of Attraction) وجود میں آتی ہے۔ اس طرح وجود میں آنے والے کیمیائی بانڈ کو آئیونک یا الیکٹروویلیٹ بانڈ کہتے ہیں۔

کیلشیم جو کہ ایک الکلائن ارضیہ میٹل ہے دو الیکٹرونز کھو کر کیلشیم کلورائیڈ بنتا ہے۔






یہ آئز ایک دوسرے کے گرد اس طرح تین جہتی (Three dimensionally) گھیرا ڈالتے ہیں کہ کرشل لیٹس (Crystal lattice) کی شکل بن جاتی ہے۔
آئیونک کمپائونڈ کی دوسری مثالیں درج ذیل ہیں۔



سوال 7: سوڈیم کلورائیڈ اور کیلیشیم کلورائیڈ کے کرشل لیٹس کی ڈایا گرام بنائیں۔
جواب: سوڈیم کلورائیڈ اور کیلیشیم کلورائیڈ کے کرشل لیٹس:



سوڈیم کلورائیڈ اور کیلیشیم کلورائیڈ کے کرشل لیٹس

مشق

1- کس قسم کے ایلیمنٹس آئیونک بانڈز بناتے ہیں؟

جواب: میٹلز اور نان میٹلز آئیونک بانڈز بناتے ہیں۔

2- آئیونک بانڈ کے لیے کن شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے؟

جواب: آئیونک بانڈ اس وقت بنتا ہے جب ایک ایٹم (میٹل) آسانی سے الیکٹرون دے سکتا ہے اور دوسرا ایٹم (نان میٹل) آسانی سے الیکٹرون لے سکتا ہے۔
الیکٹرون حاصل کرنے اور خارج کرنے کے بعد دونوں ایٹمز آئن بن جاتے ہیں جن پر مخالف چارج ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کوکشش کرتے ہیں، جس سے آئیونک بانڈ بنتا ہے۔

سوال 8: کوویلنٹ بانڈ سے کیا مراد ہے؟ کوویلنٹ بانڈ کیسے بنتا ہے؟

جواب: کوویلنٹ بانڈ: گروپ 14 تا گروپ 17 کے ایلیمنٹس کو جب ری ایکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ ایلیمنٹس ویلنس الیکٹرونز کا باہمی

اشتراک کر کے کیمیکیل بانڈ بناتے ہیں۔ اس قسم کا بانڈ جو الیکٹرونز کے باہمی اشتراک سے وجود میں آتا ہے کو ویلنٹ بانڈ کہلاتا ہے۔ جب دو ایٹمز بانڈ بنانے کی غرض سے ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں تو دونوں کی انرجی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایک ایٹم کے الیکٹرونز دوسرے ایٹم کے نیوکلئیس کی کشش میں آنے کی وجہ سے دونوں کی انرجی میں کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ایٹم کا نیوکلئیس جب دوسرے ایٹم کے نیوکلئیس کے قریب آتا ہے تو دفع کی قوتیں جنم لیتی ہیں ایسی ہی قوتیں ایٹمز کے الیکٹرونز کے نزدیک آنے کی وجہ سے بھی وجود پذیر ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے انرجی میں اضافہ ہوتا ہے۔ قریب آنے والے دونوں ایٹمز اپنے آپ کو ایک دوسرے سے اتنی دوری پر رکھتے ہیں جس سے ان کے درمیان کشش کی قوتیں دفع کی قوتوں سے زیادہ مضبوط ہوں۔ دونوں ایٹمز پھر اپنے آپ کو اتنی ہی دوری پر رہنے کو ترجیح دیں گے جس سے کشش کی قوتوں کا اثر زیادہ رہے۔ اس جگہ ان ایٹمز کی انرجی کم از کم ہوتی ہے۔ اس طرح ایک مالیکیول وجود میں آتا ہے۔

سوال 9: کو ویلنٹ بانڈ کی اقسام کی وضاحت کریں اور ہر قسم کے لیے کم از کم ایک مثال دیں۔

جواب: کو ویلنٹ بانڈ کی اقسام: کو ویلنٹ بانڈ دو ایٹمز کے درمیان الیکٹرونز کے باہمی اشتراک سے وجود میں آتا ہے۔ ایسے الیکٹرون جو کیمیکیل بانڈ بنانے کے لیے باہم جوڑے بناتے ہیں، بانڈ پیئر الیکٹرونز کہلاتے ہیں۔ بانڈ پیئر کی تعداد کے لحاظ سے کو ویلنٹ بانڈ کی درج ذیل تین اقسام ہیں۔


1- سنگل کو ویلنٹ بانڈ 2- ڈبل کو ویلنٹ بانڈ 3- ٹریپل کو ویلنٹ بانڈ

1- سنگل کو ویلنٹ بانڈ: جب کو ویلنٹ بانڈ بنانے والا ہر ایٹم ایک ایک الیکٹرون فراہم کرتا ہے تو ایک بانڈ پیئر وجود میں آتا ہے۔ اسے سنگل کو ویلنٹ بانڈ کہتے ہیں۔

ایٹمز کے درمیان موجود سنگل کو ویلنٹ بانڈ کو سنگل لائن (=) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔


سنگل کو ویلنٹ بانڈ کی مثالیں ہائیڈروجن (H_2)، کلورین (Cl_2)، ہائیڈروجن کلورائیڈ گیس (HCl) اور میتھین (CH_4) ہیں۔

(ii) کلورین کا بننا: جب کلورین کے دو ایٹمز ملتے ہیں تو ان ایٹمز کے درمیان ایک الیکٹرون پیئر کا اشتراک ہوتا ہے۔ جس سے ایک سٹیبیل کلورین مالیکیول بنتا ہے۔



سنگل کو ویلنٹ بانڈ کا بننا


(ii) ہائیڈروجن کا بننا: جب دو ہائیڈروجن ایٹمز ملتے ہیں تو ان کے درمیان ایک الیکٹرون پیئر کا اشتراک ہوتا ہے جس سے ایک سٹیبیل ہائیڈروجن مالیکیول بنتا ہے۔



سنگل کو ویلنٹ بانڈ کا بننا

2- ڈبل کو ویلنٹ بانڈ: جب ہر بانڈ بنانے والا ایٹم دو دو الیکٹرونز فراہم کرتا ہے تو دو عدد بانڈ پیئر کی شراکت بنتی ہے اور ایک ڈبل کو ویلنٹ بانڈ وجود میں آتا ہے۔ ایٹمز کے درمیان ڈبل کو ویلنٹ بانڈ دو لائنز (=) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثالیں: آکسیجن گیس (O_2) اور ایتھین (C_2H_4) میں ڈبل کوویلنٹ بانڈز بنتے ہیں۔
آکسیجن مالیکیول کا بننا:




ڈبل کوویلنٹ بانڈ کا بننا

3- ٹریپل کوویلنٹ بانڈ: جب بانڈ بنانے والا ہر ایٹم تین تین الیکٹرونز فراہم کرتا ہے تو بانڈز بننے کے عمل میں تین بانڈ پیرز حصہ لیتے ہیں اس قسم کے بانڈز کو ٹریپل کوویلنٹ بانڈ کہتے ہیں۔

ٹریپل کوویلنٹ بانڈ کو تین لائنوں ($\equiv$) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثالیں: ٹریپل کوویلنٹ بانڈ رکھنے والے مالیکیولز کی مثالیں نائٹروجن (N_2) اور ایتھین (C_2H_2) ہیں۔
نائٹروجن مالیکیول کا بننا:



ٹریپل کوویلنٹ بانڈ کا بننا

مشق

1- کس قسم کے ایٹم ٹیس کوویلنٹ بانڈ بناتے ہیں؟

جواب: نان میٹلو کوویلنٹ بانڈ بناتی ہیں۔

2- آئیونک بانڈ اور کوویلنٹ بانڈ میں کیا فرق ہے؟

جواب:


آئیونک بانڈ	کوویلنٹ بانڈ
آئیونک بانڈ ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں الیکٹرونز کی مکمل منتقلی سے وجود میں آتا ہے۔	کوویلنٹ بانڈ الیکٹرونز کے باہمی اشتراک سے وجود میں آتا ہے۔
آئیونک بانڈ میٹلو اور نان میٹلو دونوں میں بنتا ہے۔	کوویلنٹ بانڈ صرف نان میٹلو میں بنتا ہے۔

سوال 10: درج ذیل میں دیے گئے کپاؤنڈز کے بننے کے عمل کی وضاحت ڈایا گرام کے ساتھ کریں۔


(i) پانی (H_2O) (ii) کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO_2) (iii) ہائیڈروجن سائیڈائیڈ (HCN)

(iv) امونیا (NH_3) (v) میتھین (CH_4) (vi) ایتھین (C_2H_2) (vii) میتھانول (H_3OH)


جواب: (i) پانی: جب دو ہائیڈروجن ایٹمز علیحدہ علیحدہ اپنے الیکٹرونز آکسیجن کے ایک ایٹم کے ساتھ شیئر کریں تو پانی کا مالیکیول بنتا ہے۔



(ii) کاربن ڈائی آکسائیڈ: کاربن ڈائی آکسائیڈ کا مالیکیول ایک کاربن ایٹم اور دو آکسیجن ایٹمز سے مل کر بنتا ہے۔ کاربن کا ایٹم اپنے دو الیکٹرونز ایک آکسیجن ایٹم کے دو الیکٹرونز سے شیئر کرتا ہے جبکہ یہی ایٹم اور دوسرا آکسیجن ایٹم بھی دو الیکٹرونز آپس میں شیئر کرتے ہیں۔




(Ammonia) امونیا



(iv)


(Hydrogen cyanide) ہائیڈروجن سائیائیڈ



(iii)


(Methane) میتھین

(v)




(Ethene) ایتھین

(vi)




(Methanol) میتھانول


(vii)




1- درج ذیل کمپاؤنڈز میں موجود کوویلنٹ بانڈز کو ڈاٹ اور کراس فارمولا سے ظاہر کریں۔ SiH_4 , PCl_3 , SO_2 , SO_3




PCl_3



جواب: SiH_4



SO_3



SO_2


سوال 11: پولر اور نان پولر کوویلنٹ بانڈز پر نوٹ لکھیں۔

جواب: نان پولر کوویلنٹ بانڈ: جب کوویلنٹ بانڈ دو ایک جیسے ایٹمز بناتے ہیں تو الیکٹرونز کا جوڑا دونوں ایٹمز کے بالکل درمیان میں ہوتا ہے۔ جس سے ایک ایسا کوویلنٹ بانڈ وجود میں آتا ہے جس میں کسی ایٹم پر کوئی چارج نہیں ہوتا۔ اس کو نان پولر کوویلنٹ بانڈ کہتے ہیں۔

مثال: ہائڈروجن مالیکول میں موجود دو ہائڈروجن ایٹمز کے درمیان بانڈ یا پھر کلورین مالیکول میں پایا جانے والا بانڈ۔ یہ دونوں بانڈز نان پولر بانڈز ہیں۔

پولر کوویلنٹ بانڈ: جب ایک کوویلنٹ بانڈ دو مختلف ایٹمز کے درمیان بنتا ہے تو شیئر ہونے والا الیکٹرونز کا جوڑا اس ایٹم کے نزدیک چلا جاتا ہے جو ان الیکٹرونز کو زیادہ قوت سے کھینچتا ہے یا جس کی الیکٹرونگیٹیوٹی (Electronegativity) زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جس ایٹم کی الیکٹرونگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے اس پر ایک چھوٹا سا منفی چارج بن جاتا ہے اور جس ایٹم کے الیکٹرونز کے کھینچنے کی طاقت کم ہوتی ہے اس پر ایک چھوٹا مثبت چارج بن جاتا ہے۔ اس طرح بننے والے کوویلنٹ بانڈ کو پولر کوویلنٹ بانڈ کہتے ہیں۔


مثال: HCl مالیکول میں شیئر ہونے والا الیکٹرونز کا جوڑا کلورین ایٹم کے نزدیک چلا جاتا ہے کیونکہ اس کی الیکٹرونگیٹیوٹی زیادہ ہے جس کی وجہ سے کلورین پر ایک چھوٹا سا منفی چارج بن جاتا ہے۔ HCl مالیکول میں موجود کوویلنٹ بانڈ پولر کوویلنٹ بانڈ کہلاتا ہے۔ اسی طرح پانی میں موجود کوویلنٹ بانڈز بھی پولر کوویلنٹ بانڈز کہلاتے ہیں۔



سوال 12: کوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ سے کیا مراد ہے؟ یہ کیسے بنتا ہے؟

جواب: کوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ: ایک ایسا کوویلنٹ بانڈ ہے جس میں الیکٹرونز کا جوڑا ایک ایٹم یا آئن یا مالیکول مہیا کرتا ہے۔ اور دوسرا ایٹم یا مالیکول اس جوڑے کو قبول کرتا ہے۔ جو شے الیکٹرونز کا جوڑا مہیا کرت ہے اس کو ڈونر (Donor) کہتے ہیں اور قبول کرنے والی شے کو ایکسیپٹر (Acceptor) کہتے ہیں۔ اس بانڈ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک تیر کا نشان ڈونر سے ایکسیپٹر کی طرف (→) بنایا جاتا ہے۔




ہائڈروآکسوئم آئن کا بننا: جب ایسڈ کو پانی میں حل کیا جاتا ہے تو پروٹائز (H^+) بنتے ہیں۔ اس پروٹان کا بیرونی شیل خالی ہونے کی وجہ سے یہ الیکٹرونز کا جوڑا قبول کرتا ہے۔ آکسیجن ایٹم پر موجود دو الیکٹرونز کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا اس پروٹان کو دے دیا جاتا ہے۔ پانی اور پروٹان کے ملاپ سے ہائڈروآکسوئم آئن بن جاتا ہے۔



پانی اور پروٹان (H^+) کے درمیان کوآرڈینیٹ بانڈ کا بننا

اس طرح وجود میں آنے والا مثبت چارج پورے ہائڈروآکسائیڈ آئن کا احاطہ کر لیتا ہے۔ ایک بار جب یہ کوآرڈینیٹ بانڈ بن جاتا ہے تو پھر اس میں اور پانی میں موجود دونوں کوویلنٹ بانڈز میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ آکسیجن سے منسلک تینوں بانڈز بالکل ایک جیسے خواص رکھتے ہیں۔ امونیا اور بورون ٹرائی فلورائیڈ کے درمیان تعامل:

کوآرڈینیٹ بانڈ کی ایک مثال اس وقت سامنے آتی ہے جب امونیا، بورون ٹرائی فلورائیڈ سے ری ایکٹ کرتی ہے۔ اس ری ایکشن کے دوران نائٹروجن پر موجود الیکٹرونز کا جوڑا بورون کے بیرونی شیل کو دے کر اس کو مکمل کیا جاتا ہے۔



اتھائل الکوحل

پروٹون
اتھائل الکوحل کا بننا

مثال میں کوآرڈینیٹ بانڈ بنانے کے لیے امونیا مالیکیول میں موجود نائٹروجن کا الیکٹرون جوڑا پروٹان کو مہیا کیا جاتا ہے۔ ہائڈرو آکسائیڈ آئن کی طرح امونیم آئن میں موجود چاروں بانڈز کے خواص بالکل ایک جیسے ہیں۔ جس سے ایک بار پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوآرڈینیٹ بانڈ بننے کا طریقہ اگرچہ کوویلنٹ بانڈ بننے سے مختلف ہے لیکن جب یہ بن جاتا ہے تو ان دونوں بانڈز میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس طرح جب کوئی کوآرڈینیٹ بانڈ بنتا ہے تو دونوں الیکٹرونز ڈونر کو واپس مل جاتے ہیں۔

مشق


1- ذیل میں درج مالیکولز یا آئنز کے درمیان کوآرڈینیٹ بانڈ بننے کے عمل کی وضاحت کریں۔

(a) BF_3 and AlCl_3 (b) CH_3OCH_3 and H^+

جواب: (a) BF_3 and AlCl_3


BF_3 اور AlCl_3 دونوں میں الیکٹرون کی کمی ہوتی ہے تاہم BF_3 میں بورون (B) کے پاس ایک خالی P آرٹیل ہوتا ہے اور AlCl_3 میں ایلو مینیم (Al) کے پاس ایک لون پیئر ہوتا ہے۔ ایلو مینیم اپنا لون پیئر بورون کے خالی P آرٹیل میں ڈونیت کرتا ہے جس سے ایک کوآرڈینیٹ بانڈ بنتا ہے۔ اس

طرح BF_3 اور $AlCl_3$ مل کر ایک ایڈکٹ بناتے ہیں۔



(b) CH_3OCH_3 and H^+

جواب: CH_3OCH_3 میں آکسیجن (O) کے پاس ایک لون پیئر ہوتا ہے اور ہائیڈروجن کے پاس کوئی الیکٹرون نہیں ہوتا۔ آکسیجن اپنا لون پیئر H^+ کو ڈونٹ کرتا ہے جس سے ایک کوآرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ بنتا ہے۔



2- کون سے کپاؤنڈ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کوآرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ بنا سکیں؟


جواب: وہ کپاؤنڈ جن میں کوئی لون پیئر موجود نہ ہو یا کوئی خالی آر بیٹل نہ ہو کوآرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ نہیں بنا سکتے۔ مثلاً، اتھین (C_2H_4)، اتھائن (C_2H_2) وغیرہ۔

3.3	مٹیلک بانڈ (Metallic Bond)
3.4	میٹلوں کا الیکٹرو پوزیٹو کرکٹر (Electropositive Character of Metals)

سوال 13: مٹیلک بانڈ کیا ہے؟ مٹیلک بانڈ کیسے بنتا ہے؟

جواب: ایسا کیمیائی بانڈ جس کی وجہ سے میٹل میں موجود مثبت چارج رکھنے والے آئنز آزاد گھومنے والے الیکٹرونز کی وجہ سے آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ عام طور پر میٹلوں کے ایٹمز کی آئیونائزیشن انرجی (Ionization Energy) کم ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے ایٹمز آسانی سے بیرونی شیل میں موجود الیکٹرون یا الیکٹرونز کو آزاد کر سکتے ہیں۔ یہی بات اگر دوسرے انداز میں کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میٹلوں کے ایٹمز میں موجود نیوکلیائی (Nuclei) اپنے الیکٹرون یا الیکٹرونز کو اپنے ساتھ مضبوطی سے باندھ کر نہیں رکھ سکتے۔


مٹیلک بانڈ کا بننا: سوڈیم میٹل میں ایک سوڈیم ایٹم کے ارد گرد آٹھ اور سوڈیم ایٹمز ہوتے ہیں۔ ان سب کے بیرونی الیکٹرونز ان ایٹمز کی درمیانی جگہوں میں آزاد نہ گھومتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی الیکٹرون کسی مخصوص نیوکلیس سے بندھا نہیں رہتا بلکہ تمام الیکٹرونز بیک وقت تمام نیوکلیائی سے بندھے ہوتے ہیں۔ اس طرح جب تمام آئنز ان آزاد گھومنے والے تمام الیکٹرونز کو بیک وقت اپنے ساتھ باندھیں گے تو خود بھی ایک دوسرے کے ساتھ بندھے جائیں گے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوگا کہ میٹل ایٹمز ان الیکٹرونز کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔



سوڈیم میٹل میں موجود مٹیلک بانڈ

سوال 14: سوڈیم اور میگنیشیم کے موازنے کی بنیاد پر مٹلیک بانڈ کی مضبوطی کو متاثر کرنے والے عوامل پر بحث کریں۔

جواب: مٹلیک بانڈ کی مضبوطی کا انحصار دو باتوں پر ہے۔ پہلی بات اس مٹل میں موجود آئنز پر مثبت چارجز کی تعداد اور دوسری بات یہ کہ ایک ایٹم نے کتنے الیکٹرونز آزاد کیے ہیں۔ مثال کے طور پر سوڈیم مٹل میں اس کا ایک ایٹم صرف ایک الیکٹرون آزاد کرتا ہے اس لیے سوڈیم مٹل میں مٹلیک بانڈ کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس میگنیشیم مٹل میں میگنیشیم کا ایک ایٹم دو الیکٹرونز آزاد کرتا ہے جس کی وجہ سے میگنیشیم کے آئنز پر دو مثبت چارج ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ میگنیشیم میں موجود مٹلیک بانڈ سوڈیم کی نسبت زیادہ مضبوط ہوگا۔ اسی وجہ سے میگنیشیم کا مپلنگ پوائنٹ سوڈیم سے کافی زیادہ ہے۔



میگنیشیم میں موجود مٹلیک بانڈ

سوال 15: مٹلو کے خواص لکھیں۔

جواب: مٹلو کے خواص:

- مٹلو کی سطح عام طور پر چمکدار ہوتی ہے۔
- مٹلو کے مپلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
- مٹلو بجلی اور حرارت دونوں کی کنڈکٹر ہیں۔
- عام طور پر مٹلو بھاری اور سخت ہوتی ہیں۔
- دباؤ سے مٹلو کی شکل و صورت تبدیل کی جاسکتی ہے۔

سوال 16: الیکٹروپازٹیو کریکٹر سے کیا مراد ہے؟ الیکٹروپازٹیو کریکٹر اور ری ایکٹیویٹی کے درمیان کیا تعلق ہے مثال سے واضح کریں۔

جواب: الیکٹروپازٹیو کریکٹر: مٹلو کی الیکٹرونز کھونے کی صلاحیت کو الیکٹروپازٹیو کریکٹر کہتے ہیں۔

الیکٹروپازٹیو کریکٹر اور ری ایکٹیویٹی کے درمیان تعلق: عام طور پر مٹلو کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے الیکٹرون یا الیکٹرونز کسی کو دے کر مثبت آئنز یا کیا آئن بنائیں۔ مٹلو اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے الیکٹروپوزٹیو کہلاتی ہیں۔ اس خصوصیت کا تعلق براہ راست ان کی ری ایکٹیویٹی سے بھی ہے۔ مٹلو جتنی آسانی سے الیکٹرون یا الیکٹرونز کا تبادلہ کریں گی وہ اتنی ہی زیادہ ایکٹو ہوں گی۔

مثال: الکلی مٹلو (سوڈیم اور پوٹاشیم) بہت زیادہ الیکٹروپوزٹیو ہیں اس لیے وہ بڑی آسانی سے ری ایکٹ کرتی ہیں۔ سوڈیم اور پوٹاشیم، پانی اور کلورین سے تیزی سے ری ایکٹ کر کے بالترتیب ہائیڈروآکسائیڈز اور کلورائیڈز بناتی ہیں۔ یہ تیزابوں سے ری ایکٹ کر کے سالٹس بناتی ہیں اور ہائیڈروجن خارج کرتی ہیں۔ ان کے مقابلے میں الکلائن اترتھ مٹلو اپنے الیکٹرونز نسبتاً مشکل سے چھوڑتی ہیں اور یہ مقابلتہ کم الیکٹروپوزٹیو ہیں۔ پانی اور کلورین کے ساتھ بھی ان کے ری ایکشنز تیزی کے ساتھ وقوع پذیر نہیں ہوتے۔ ایلومینیم بھی ایک زیادہ الیکٹروپوزٹیو ایلیمینٹ ہے اور یہ ایسڈز سے تیزی سے ری ایکٹ کر کے سالٹس اور ہائیڈروجن بناتی ہے۔

سوال 17: نان میٹلوں کے الیکٹرو نیگیو کیریٹر سے کیا مراد ہے؟

جواب: الیکٹرو نیگیو کیریٹر: نان میٹلوں کی الیکٹرونز حاصل کرنے کی صلاحیت کو نان میٹلوں کی الیکٹرو نیگیوٹیٹی کہتے ہیں۔

وضاحت: نان میٹلوں کی الیکٹرونز سے رغبت کی وجہ سے ان کو اپنے میں جذب کر کے اینائنز (Anions) بناتی ہیں۔ اس لیے ان کو الیکٹرو نیگیوٹیٹی ایلیمینٹس کا نام دیا گیا ہے۔ پیریاڈک ٹیبل میں موجود فلورین سب سے زیادہ الیکٹرو نیگیوٹیٹی ایلیمینٹ ہے۔ اور اس کے بعد آکسیجن، نائٹروجن اور کلورین کا نمبر آتا ہے۔ نان میٹلوں، میٹلوں کے ساتھ تیزی سے ری ایکٹ کر کے آئیونک بانڈز بناتی ہیں۔ نان میٹلوں دوسری نان میٹلوں سے ری ایکٹ کر کے مالیکیولر کمپاؤنڈز بناتی ہیں۔

سوال 18: آئیونک اور کوویلنٹ کمپاؤنڈز کی خصوصیات کا موازنہ کریں۔

جواب: آئیونک اور کوویلنٹ کمپاؤنڈز کی خصوصیات میں تقابلہ:

کوویلنٹ کمپاؤنڈز

i- کوویلنٹ کمپاؤنڈز زیادہ تر نیوٹرل مالیکیولز کے طور پر پائے جاتے ہیں۔ ان میں موجود اینائنز کے نیوکلیائی اور شیئرڈ الیکٹرونز کے درمیان خاصی مضبوط کشش موجود ہوتی ہے۔

ii- دو یا دو سے زیادہ نان میٹلوں کو کوویلنٹ کمپاؤنڈز بناتی ہیں۔ کم مالیکیولر ماس رکھنے والے کوویلنٹ کمپاؤنڈز عام طور پر یا تو گیس ہیں یا پھر ایسے مائع ہیں جن کے بوائونگ پوائنٹس کم ہوتے ہیں۔ زیادہ مالیکیولر ماس رکھنے والے کمپاؤنڈز زیادہ تر ٹھوس حالت میں ملتے ہیں۔ اور عام طور پر ان کے میلنگ اور بوائونگ پوائنٹس کم ہوتے ہیں۔

iii- یہ زیادہ تر پانی میں حل نہیں ہوتے لیکن نان پولر سولونٹس مثلاً ایٹر، ہینزین اور ایسیٹون میں حل ہو جاتے ہیں۔

iv- عام طور پر یہ بجلی کے کنڈکٹر نہیں ہوتے۔

آئیونک کمپاؤنڈز

i- آئیونک کمپاؤنڈز میں مخالف چارج رکھنے والے آئنز موجود ہوتے ہیں جو خود کو مخصوص ترتیب دے کر کرسٹلائن سٹرکچر بناتے ہیں۔ آئیونک کمپاؤنڈ ایک نیوٹرل کمپاؤنڈ ہوتا ہے اور اس میں موجود مخالف چارجز رکھنے والے آئنز کے درمیان موجود کشش کی قوت کو الیکٹرو سٹیک فورس کہتے ہیں۔

ii- آئیونک کمپاؤنڈز عام طور پر ٹھوس حالت میں ملتے ہیں۔ ان کے میلنگ اور بوائونگ پوائنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلاً سوڈیم کلورائیڈ کا میلنگ پوائنٹ 801°C ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں موجود سوڈیم اور کلورائیڈ آئنز کے درمیان کشش کی مضبوط قوت موجود ہے۔

iii- آئیونک کمپاؤنڈز عام طور پر پولر سولونٹ مثلاً پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔

iv- پگھلی ہوئی حالت میں اور سلوشنز کی صورت میں چونکہ ان کے آئنز آزادانہ حرکت کرتے ہیں اس لیے ان دونوں صورتوں میں یہ بجلی کے کنڈکٹر ہیں۔

سوال 19: انٹر مالیکیولر فورسز سے کیا مراد ہے؟ طبعی خصوصیات پر انٹر مالیکیولر فورسز کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟

جواب: انٹر مالیکیولر فورسز: ایلیمینٹس اور مالیکیولز کے درمیان کشش کی قوتوں کو انٹر مالیکیولر فورسز آف آٹریکشن کہتے ہیں۔ کشش کی یہ قوتیں عام طور پر اینائنز کے درمیان کیمیائی بانڈ کی نسبت بہت کمزور ہوتی ہیں۔

طبعی خصوصیات پر اثر: مادہ کی تین حالتوں میں سے کسی حالت میں یہ کشش کی قوتیں دوسری حالتوں کی نسبت بہت کمزور ہوتی ہیں جبکہ ٹھوس حالت

میں مالیکولز کے درمیان یہ کشش کی قوتیں سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔


مالیکولز کے درمیان یہ کشش کی قوتیں بہت سی قسموں کی ہیں ان میں سے کچھ کمزور ہوتی ہیں اور کچھ نسبتاً طاقتور۔ اشیاء کی طبعی خصوصیات کا انحصار ان قوتوں پر ہوتا ہے۔ اشیاء کے میلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس کا انحصار کشش کی ان قوتوں کی طاقت پر ہے۔ یہ قوتیں جتنی طاقتور ہوں گی اشیاء کے میلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔

سوال 20: انٹر مالیکولر فورسز کی اقسام کی وضاحت کریں۔


جواب: انٹر مالیکولر فورسز: ایلیمینٹس اور مالیکولز کے درمیان کشش کی قوتوں کو انٹر مالیکولر فورسز آف اٹریکشن کہتے ہیں۔
انٹر مالیکولر فورسز کی اقسام: انٹر مالیکولر فورسز کی اقسام درج ذیل ہیں:

1- ڈائی پول۔ ڈائی پول کشش کی قوتیں 2- ہائیڈروجن بانڈنگ


1- ڈائی پول۔ ڈائی پول کشش کی قوتیں: کشش کی یہ قوتیں پولر کمپاؤنڈ مثلاً HCl میں پائی جاتی ہیں۔ HCl میں موجود ہائیڈروجن اور کلورین اپنے درمیان بانٹے گئے الیکٹرونی جوڑے کو مختلف طاقتوں سے کھینچتے ہیں۔ ایٹم کی اس طاقت کو الیکٹرو نیگیٹیویٹی کہتے ہیں۔ چونکہ کلورین کا ایٹم بانٹے گئے الیکٹرونی جوڑے کو زیادہ قوت سے کھینچتا ہے اس لیے یہ جوڑا اس کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً کلورین ایٹم پر ایک چھوٹا سا منفی چارج بن جاتا ہے۔ اس طرح کا مثبت چارج ہائیڈروجن پر بھی بن جاتا ہے۔ ان چارجز کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ HCl ایک پولر مالیکول ہے۔



ان مثبت اور منفی چارجز کی وجہ سے HCl کے مالیکولز آپس میں کشش رکھتے ہیں۔ کشش کیا اس قوت کو ڈائی پول۔ ڈائی پول کشش کی قوتیں کہتے ہیں۔



2- ہائیڈروجن بانڈنگ: ہائیڈروجن بانڈنگ، ڈائی پول۔ ڈائی پول کشش کی قوتوں کی ایک مخصوص شکل ہے۔ جب ہائیڈروجن ایٹم بہت زیادہ الیکٹرو نیگیٹیو ایلیمینٹس کے ایٹمز یعنی O، F یا N کے ساتھ کوویلنٹ بانڈز بناتا ہے تو ان کے درمیان الیکٹرو نیگیٹیویٹی کے بہت زیادہ فرق کی وجہ سے یہ بانڈز بہت زیادہ پولر بن جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بہت طاقتور ڈائی پول۔ ڈائی پول کشش کی قوتیں وجود میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی میں O-H بانڈز بہت زیادہ پولر بن جاتے ہیں۔ تبھی ان کے درمیان کشش کی بہت مضبوط قوتیں وجود میں آتی ہیں جن کو ہائیڈروجن بانڈنگ کہتے ہیں۔



پانی میں موجود طاقتور ہائیڈروجن بانڈز ہونے کی وجہ سے اس کے میلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس ان سے ملے جلتے کمپاؤنڈز H_2S اور NH_3 سے زیادہ ہوتے ہیں۔

3.8 اشیاء میں موجود بانڈنگ اور ان کی خصوصیات کا آپس میں تعلق (Nature of Bonding and Properties)



سوال 21: آئیونک کمپاؤنڈز میں کرسٹل لینس کی تشکیل کیسے ہوتی ہے؟

جواب: آئیونک کمپاؤنڈز میں مخالف چارجز رکھنے والے آئنز کے درمیان مضبوط کشش کی قوتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آئنز کرسٹل لینس (Crystal)

(lattice بناتے ہیں۔ چونکہ آئنز بیضوی شکل رکھتے ہیں اس لیے ہر آئن کے چاروں اطراف مخالف آئنز کا گھیرا بن جاتا ہے آئنز کی اس ترتیب کو کرمل لیس کہتے ہیں۔ آئنز کے بیضوی ہونے کی وجہ سے آئیونک بانڈ کی کوئی سمت نہیں ہوتی بلکہ اس کی وجہ سے وجود میں آنے والی قوتیں آئن کے چاروں طرف موجود ہوتی ہیں۔

سوال 22: آئیونک کمپاؤنڈ میں ہائڈریشن کے عمل کی وضاحت کریں۔


جواب: آئیونک کمپاؤنڈ عام طور پر پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔ پانی کے مالیکیولز نہ صرف آئیونک کمپاؤنڈز میں موجود آئنز کے درمیان کشش کی مضبوط قوتوں کو توڑ دیتے ہیں بلکہ آزاد ہونے والے آئنز کے درمیان ایک گھیرا بھی بنا لیتے ہیں۔ گھیرا بنانے کے اس عمل کو ہائڈریشن (Hydration) کہتے ہیں۔



آئنز کی ہائڈریشن

سوال 23: آئیونک کمپاؤنڈ پانی میں حل پذیر ہیں؟ مثال سے واضح کریں۔

جواب: عام طور پر آئیونک کمپاؤنڈز پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔ جن سے ان میں موجود آئنز بھی ایک دوسرے سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ سلوشن بجلی کے کنڈکٹر بن جاتے ہیں۔ اس طرح آئیونک کمپاؤنڈز کا آپس میں ری ایکشن بھی پانی میں ہی ہوتا ہے۔ پانی میں ان کے آئنز آپس میں ری ایکٹ کر کے نیا کمپاؤنڈ بنا لیتے ہیں۔



غیر حل شدہ سلور کلورائیڈ کا سفید رسوب (Precipitate) پانی سے الگ ہو کر نیچے بیٹھ جاتا ہے۔

سوال 24: آئیونک کمپاؤنڈز سے کیا مراد ہے؟ ان کی خصوصیات لکھیں۔

جواب: آئیونک کمپاؤنڈز: آئیونک کمپاؤنڈز ایسے کمپاؤنڈز ہیں جو مخالف چارج والے آئنز کے درمیان الیکٹروستیک کشش سے بنتے ہیں۔ یہ آئنز میٹل اور نان میٹل کے درمیان الیکٹرونز کی منتقلی سے بنتے ہیں۔

مثلاً: CaO, MgO, NaCl, KF وغیرہ۔

خصوصیات:

- (i) آئیونک کمپاؤنڈز کرشل لیٹس بناتے ہیں۔
- (ii) یہ پازینو اور نیکیٹو آئنز پر مشتمل ہوتے ہیں۔
- (iii) یہ روم ٹمپرچر پر ٹھوس ہوتے ہیں۔
- (iv) ان کے میلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس زیادہ ہوتے ہیں۔
- (v) یہ پولر سولوشن جیسے کہ پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں۔
- (vi) یہ ہیٹ اور الیکٹریسیٹی کے اچھے کنڈکٹرز ہیں۔
- (vii) یہ سخت ہوتے ہیں۔

سوال 25: کوویلنٹ کمپاؤنڈز سے کیا مراد ہے؟ ان کی خصوصیات لکھیں۔

جواب: کوویلنٹ کمپاؤنڈ: کوویلنٹ کمپاؤنڈز وہ کمپاؤنڈز ہیں جو ایٹمز کے درمیان الیکٹرونز کی شراکت سے بنتے ہیں۔ اس شراکت سے ایک کوویلنٹ بانڈ بنتا ہے۔

کوویلنٹ کمپاؤنڈ کی خصوصیات:

- (i) کوویلنٹ کمپاؤنڈ کے میلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس کم ہوتے ہیں۔
- (ii) یہ زیادہ تر نان پولر سولوشن میں حل پذیر ہوتے ہیں جیسے کہ ایٹھر، بینزین۔
- (iii) یہ عام طور پر بجلی کے اچھے کنڈکٹرز نہیں ہوتے۔
- (iv) یہ زیادہ تر نیوٹرل مالیکیولز کے طور پر پائے جاتے ہیں۔

سوال 26: گریفائٹ پر مختصر نوٹ لکھیں۔

جواب: گریفائٹ میں چھ کاربن ایٹمز مل کر ایکوگنل رنگز (Hexagonal rings) بناتے ہیں اور پھر بہت سے یہ رنگز درتہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ چونکہ ہر تہ کا دوسری تہ سے تعلق زیادہ مضبوط نہیں ہوتا اس لیے یہ ایک دوسرے پر آسانی سے پھسل جاتے ہیں۔ اس وجہ سے گریفائٹ کو صنعتی پیمانے پر لبریکنٹ (Lubricant) کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید گریفائٹ کی تہوں کے درمیان آزادانہ حرکت کرنے والے الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں۔ جو اس کو نہایت اچھا بجلی کا کنڈکٹر بناتے ہیں۔ اس لیے اس کو الیکٹروڈز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

گریفائٹ کے استعمالات:

گریفائٹ سے پنسل، پالش اور کٹھالیاں (Crucibles) بنائی جاتی ہیں۔ گریفائٹ سے بنے الیکٹروڈز (Electrodes) عام بیٹری سیل اور ایسی بھٹیوں (furnaces) میں استعمال ہوتے ہیں جن سے سٹیل بنتا ہے۔

دلچسپ معلومات

- ایٹم میں موجود نیوکلیس سے باہر الیکٹرونز اور سب شیلز میں موجود ہوتے ہیں۔ الیکٹرونز کی اس ترتیب کو الیکٹرونک کنفیگوریشن Electronic Configuration کہتے ہیں۔
- مٹلو کی وسیع پیمانے پر صنعتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کو مشینری، کاریں، ریلوے، ہوائی جہاز، راکٹ، جیولری اور بجلی کی تاریں وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مٹلو تعمیراتی صنعت اور الیکٹرونکس کی صنعت میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔
- پگھلے ہوئے آئیونک کمپاؤنڈز یا پانی میں ان کے سلوشن میں سے جب بجلی گزاری جاتی ہے تو اس عمل کے دوران مختلف آئنمنٹس اوکپاؤنڈز بنتے ہیں۔ مثلاً پگھلے ہوئے سوڈیم کلورائیڈ سے اگر بجلی گزاری جائے تو اس کا الیکٹرولیسز (Electrolysis) ہو جاتا ہے اور سوڈیم مٹل اور کلورین گیس بنتے ہیں۔ اس طرح پانی میں سوڈیم کلورائیڈ کی الیکٹرولیسز کرنے سے سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ اور کلورین گیس بنتے ہیں۔
- انتہائی سخت شہ ہونے کی وجہ سے ہیرے بہت اہم ہیں اور بہت سی صنعتوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہیرے لگی پنسل کی مدد سے شیشہ کو بڑی خوب صورتی سے کاٹا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ہیرے لگی ڈرل سے پہاڑوں میں سوراخ کیے جاسکتے ہیں اور ان کو کان کنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
- گریفائٹ سے پنسل، پالش اور کٹھالیاں (Crucibles) بنائی جاتی ہیں۔ گریفائٹ سے بنے الیکٹروڈز (Electrodes) عام بیٹری سیل اور ایسی بھٹیوں (Furnaces) میں استعمال ہوتے ہیں جن سے سٹیل بنتا ہے۔

انسانی طرز کنسپیکوئل (Conceptual) سوالات

سوال 1: مولٹن فارم میں آئیونک کپاؤنڈز کی اہمیت لکھیں۔

جواب: پگھلے ہوئے آئیونک کپاؤنڈز یا پانی میں جب ان کے سلوشن سے بجلی گزاری جاتی ہے تو اس عمل کے دوران مختلف الیمینٹس اور کپاؤنڈز بنتے ہیں۔ مثلاً پگھلے ہوئے سوڈیم کلورائیڈ سے جب بجلی گاری جائے تو اس کی الیکٹرولیسز ہوتی ہے اور سوڈیم میٹل اور کلورین گیس بنتی ہے۔ اس طرح پانی میں سوڈیم کلورائیڈ کی الیکٹرولیسز کرنے سے سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ اور کلورین گیس بنتے ہیں۔

سوال 2: ڈائمنڈ اور گریفائٹ کی کمرشل اہمیت بیان کریں۔

جواب: انتہائی سخت شے ہونے کی وجہ سے ہیرے بہت اہم ہیں اور بہت سی صنعتوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہیرے والی پنسل کی مدد سے شیشہ کو بری خوبصورتی سے کاٹا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ہیرے والی ڈرل سے پہاڑوں میں سوراخ کیے جاسکتے ہیں اور ان کو کان کنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گریفائٹ: گریفائٹ سے پنسل، پالش اور کٹھالیاں (کروسپیل) بنائی جاتی ہیں۔ گریفائٹ سے بنے الیکٹروڈز عام بیڑی سیل اور ایسی بیوں میں استعمال ہیں جن سے شعل بنتا ہے۔

سوال 3: میٹلز کے استعمالات لکھیں۔

جواب: مختلف دھاتوں (میٹلز) کے استعمالات درج ذیل ہیں۔

1- لوہا (Iron):

2- تانبا (Copper):

(i)

(ii)

3- آلومینیم (Aluminium):

(i)

(ii)

4- سونا (Gold):

(i)

(ii)

5- چاندی (Silver):

(i)

(ii)

معروضی سوالات

مختصر جواب کی نوعیت کی امتحانی تکنیک (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے کثیر الانتخابی سوالات

ایمز کیمیکل ہاؤس کیوں بناتے ہیں؟	3.1
کیمیکل ہاؤس	3.2

درست جواب کا انتخاب کریں۔

1- ایمز کے آخری فیل میں دو الیکٹرون حاصل کرنے کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے:

(A) آکائیڈ رول

(B) ڈوپائیڈ رول

(C) ہائڈرول

(D) اینٹی ہائڈرول

ایٹم کے آخری شیل میں آٹھ الیکٹرون حاصل کرنے کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے:

- 2- (A) آکٹیٹ رول (B) ڈپلیٹ رول (C) a اور b دونوں (D) الیکٹرونیکس یوٹی رول
- 3- کشش کی قوت جو پارٹیکلز کو آپس میں جوڑتی ہے کہلاتی ہے:
- 4- (A) آکٹیٹ رول (B) ڈپلیٹ رول (C) کیمیکل بانڈ (D) ان میں سے کوئی نہیں
- 5- نیوکلیس کے گرد الیکٹرون کی ترتیب کہلاتی ہے:
- 6- (A) الیکٹرونک کنفیگریشن (B) ٹریل کوویلنٹ بانڈ (C) الیکٹرونیکس یوٹی (D) آئیونک بانڈ
- 7- سوڈیم کلورائیڈ میں کس قسم کا کیمیکل بانڈ موجود ہوتا ہے؟
- 8- (A) کوویلنٹ بانڈ (B) میٹلک بانڈ (C) آئیونک بانڈ (D) کو-آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ
- 9- الیکٹرون کی مکمل منتقلی سے بننے والا بانڈ کہلاتا ہے:
- 10- (A) آئیونک بانڈ (B) کوویلنٹ بانڈ (C) میٹلک بانڈ (D) کو-آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ
- 11- کس قسم کے ایٹمز آئیونک بانڈ بناتے ہیں؟
- 12- (A) میٹلز (B) نان میٹلز (C) میٹلز اور نان میٹلز (D) ان میں سے کوئی نہیں
- 13- کیلشیم اور کلورین کے درمیان کس قسم کا کیمیکل بانڈ بنتا ہے؟
- 14- (A) آئیونک بانڈ (B) کوویلنٹ بانڈ (C) میٹلک بانڈ (D) کو-آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ
- 15- دو ایٹمز کے درمیان الیکٹرونز کے باہمی اشتراک سے بننے والا بانڈ کہلاتا ہے:
- 16- (A) آئیونک بانڈ (B) ڈبل کوویلنٹ بانڈ (C) ٹریپل کوویلنٹ بانڈ (D) سنگل کوویلنٹ بانڈ
- 17- کونسا کوویلنٹ بانڈ الیکٹرونز کے دو جوڑوں کے باہمی اشتراک سے بنتا ہے؟
- 18- (A) آئیونک بانڈ (B) ڈبل کوویلنٹ بانڈ (C) ٹریپل کوویلنٹ بانڈ (D) سنگل کوویلنٹ بانڈ
- 19- کونسا ایٹمز کوویلنٹ بانڈ بناتے ہیں؟
- 20- (A) میٹلز (B) نان میٹلز (C) میٹلز اور نان میٹلز (D) ان میں سے کوئی نہیں
- 21- دو آکسیجن ایٹمز کے درمیان کونسا کوویلنٹ بانڈ موجود ہوتا ہے؟
- 22- (A) ڈبل کوویلنٹ بانڈ (B) سنگل کوویلنٹ بانڈ (C) ٹریپل کوویلنٹ بانڈ (D) کو-آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ
- 23- دو نائٹروجن ایٹمز کے درمیان کس قسم کا کیمیکل بانڈ موجود ہوتا ہے؟
- 24- (A) میٹلک بانڈ (B) ٹریپل کوویلنٹ بانڈ (C) ڈبل کوویلنٹ بانڈ (D) سنگل کوویلنٹ بانڈ
- 25- جب کوویلنٹ بانڈ بنانے والا ہر ایٹم ایک ایک الیکٹرون فراہم کرے تو اسے کہتے ہیں:
- 26- (A) کو-آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ (B) سنگل کوویلنٹ بانڈ (C) ڈبل کوویلنٹ بانڈ (D) ٹریپل کوویلنٹ بانڈ
- 27- مندرجہ ذیل میں سے کونسا مالکیول آئیونک بانڈ بناتا ہے؟
- 28- (A) H_2O (B) CH_4 (C) $NaCl$ (D) CO_2

16- ایسا بائڈ جو ملیک ایئرز کے درمیان موبائل الیکٹرونز کی وجہ سے تشکیل پاتا ہے، کہلاتا ہے:

- (A) آئیونک بائڈ (B) کوویلنٹ بائڈ (C) ملیک بائڈ (D) ڈبل کوویلنٹ بائڈ

17- کس قسم کے ایلیمنٹس ملیک بائڈ بناتے ہیں؟

- (A) میٹلز (B) نان میٹلز (C) میٹلز اور نان میٹلز دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

18- میٹلوکس کی موجودگی کی وجہ سے الیکٹریسیٹی کے اچھے کنڈکٹرز ہیں؟

- (A) پروٹوز (B) نیوٹرونز (C) موبائل الیکٹرونز (D) پروٹوز اور نیوٹرونز

19- کونے ایلیمنٹس لسر (چمک) ظاہر کرتے ہیں؟

- (A) میٹلز (B) نان میٹلز (C) a اور b دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

20- کس ایلیمنٹ میں ملیک بائڈ تک ہوتی ہے؟

- (A) میگنیشیم (B) کلورین (C) نائٹروجن (D) آکسیجن

3.4	میٹلوکس کا الیکٹروپازٹیو کریکٹر
3.5	نان میٹلوکس کا الیکٹرونیگیٹیو کریکٹر
3.6	آئیونک اور کوویلنٹ کپاؤنڈز کی خصوصیات کا موازنہ

21- کس قسم کے ایلیمنٹس میں الیکٹرونز کھونے کی صلاحیت ہوتی ہے؟

- (A) نان میٹلز (B) میٹلز (C) میٹلز اور نان میٹلز (D) میٹلائڈز

22- میٹلوکس کی الیکٹرونز کھونے کی صلاحیت کو کہتے ہیں:

- (A) الیکٹروپازٹیو کریکٹر (B) الیکٹرونیگیٹیو کریکٹر (C) a اور b دونوں (D) الیکٹرونیگیٹیوٹی

23- نان میٹلوکس کی الیکٹرونز حاصل کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں:

- (A) الیکٹرونیگیٹیو کریکٹر (B) الیکٹروپازٹیو کریکٹر (C) آئیونائزیشن انرجی (D) الیکٹرون افینٹی

24- مندرجہ ذیل میں سے کونسا ایلیمنٹ پریازڈک ٹیبل میں سب سے زیادہ الیکٹرونیگیٹیو ہے؟

- (A) سوڈیم (B) فلورین (C) میگنیشیم (D) ہائڈروجن

25- آئیونک بائڈ بنانے والے کپاؤنڈز کو کہا جاتا ہے:

- (A) آئیونک کپاؤنڈز (B) کوویلنٹ کپاؤنڈز (C) میٹلز (D) نان میٹلز

26- کون سے کپاؤنڈز رائیٹکس اور مولن فارم میں الیکٹریسیٹی کے اچھے کنڈکٹرز ہیں؟

- (A) کوویلنٹ کپاؤنڈز (B) آئیونک کپاؤنڈز (C) نان میٹلز (D) میٹلز اور نان میٹلز

27- آئیونک کپاؤنڈز کس کی موجودگی کی وجہ سے الیکٹریسیٹی کے اچھے کنڈکٹرز ہیں؟

- (A) فری پروٹوز (B) فری آئنز (C) فری نیوٹرونز (D) فری مالیکیولز

28- کوویلنٹ بائڈ بنتے ہیں:

- (A) میٹلوکس کے درمیان (B) میٹلز اور نان میٹلوکس کے درمیان (C) نان میٹلوکس کے درمیان (D) ان میں سے کوئی نہیں

29- کمپاؤنڈ کے مختلف مالیکیولز کے درمیان کشش کی قوتیں کہلاتی ہیں:

(A) انٹر مالیکیولر فورسز (B) آئیونک فورسز (C) نیوٹرل فورسز (D) نیچرل فورسز

30- کس ہائیڈروجن کی وجہ سے پانی کا بوائٹنگ پوائنٹ H_2S اور NH_3 سے زیادہ ہے؟

(A) آئیونک ہائیڈروجن کی وجہ سے (B) کوویلنٹ ہائیڈروجن کی وجہ سے
(C) میٹلک ہائیڈروجن کی وجہ سے (D) ہائیڈروجن ہائیڈروجن کی وجہ سے

31- ڈائی پول۔ ڈائی پول فورسز موجود ہوتی ہیں:

(A) H_2 (B) O_2 (C) HCl (D) N_2

32- انٹر مالیکیولر فورسز مضبوط ہوتی ہیں:

(A) H_2O (B) H_2 (C) N_2 (D) O_2

33- کسی ایٹم کی مالیکیول میں موجود اشتراک شدہ الیکٹرون پیر کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت کہلاتی ہے:

(A) الیکٹرو نیگیٹیوٹی (B) الیکٹر پازیٹیوٹی (C) میٹلک ہائیڈ (D) آئیونائزیشن انرجی

اشیاء میں موجود ہائیڈروجن اور ان کی خصوصیات کا آپس میں تعلق

3.8

34- آئیونک ہائیڈ ہیں:

(A) ڈائیٹریکشل (B) نان۔ ڈائیٹریکشل (C) a اور b دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

35- آئیونک کمپاؤنڈز عام طور پر حل پذیر ہوتے ہیں:

(A) پانی (B) پیٹرول (C) الکحل (D) ایٹر

36- پیراڈک ٹیبل کے دائیں جانب موجود ایٹمز ہیں:

(A) ٹرائی اٹامک مالیکیولز (B) مونو اٹامک مالیکیولز (C) ڈائی اٹامک مالیکیولز (D) ان میں سے کوئی نہیں

37- کوویلنٹ کمپاؤنڈز جیسے کہ سلفورک ایسڈ، ہائیڈروجن کلورائیڈ اور نائٹرک ایسڈ پانی میں مکمل طور پر آئیونائز ہو کر جاتے ہیں۔

(A) کمزور ایسڈز (B) مضبوط ایسڈز (C) نان الیکٹرو لائٹس (D) الیکٹرو لائٹس

38- مندرجہ ذیل میں سے کونسا بائنری کوویلنٹ کمپاؤنڈ ہے؟

(A) CH_4 (B) H_2SO_4 (C) HNO_3 (D) O_3

39- مندرجہ ذیل میں سے کونسی کاربن کی ایسورس فارم ہے؟

(A) ڈائمنڈ (B) گریفائٹ (C) پانی (D) کوئلہ

40- مندرجہ ذیل میں سے کونسی چیز اس سیارے پر سب سے سخت ہے؟

(A) کوئلہ (B) ڈائمنڈ (C) گریفائٹ (D) پانی

41- گریفائٹ الیکٹریسیٹی کا اچھا کنڈکٹر ہے:

(A) فری آئنز کی وجہ سے (B) موبائل الیکٹرونز کی وجہ سے (C) موبائل پروٹونز کی وجہ سے (D) موبائل نیوٹرونز کی وجہ سے

42- کونسا کوویلنٹ کمپاؤنڈ روم ٹمپریچر پر گیس ہے؟

(A) پانی (B) آکسیجن (C) امونیا (D) سوڈیم کلورائیڈ

(D) کلورین

(C) نائٹروجن

(B) کاربن

(A) آکسیجن

جوابات

(B) -10	(C) -9	(A) -8	(C) -7	(A) -6	(C) -5	(A) -4	(C) -3	(A) -2	(B) -1
(A) -20	(A) -19	(C) -18	(A) -17	(C) -16	(C) -15	(A) -14	(B) -13	(A) -12	(B) -11
(D) -30	(A) -29	(C) -28	(B) -27	(B) -26	(A) -25	(B) -24	(A) -23	(A) -22	(B) -21
(B) -40	(D) -39	(A) -38	(B) -37	(C) -36	(A) -35	(B) -34	(A) -33	(A) -32	(C) -31
							(B) -43	(C) -42	(B) -41

کثیر الانتخابی کنسپچوئل (Conceptual) سوالات

درست جواب کا انتخاب کریں۔

- ایٹمز کے درمیان الیکٹرونز کی منتقلی جہتی ہے۔
(A) آئیونک بانڈ (B) متیلک بانڈ (C) کوویلنٹ بانڈ (D) ہائیڈروجن بانڈ
- ٹان میٹلز کے درمیان کونسا بانڈ موجود ہوتا ہے؟
(A) آئیونک بانڈ (B) کوویلنٹ بانڈ (C) ہائیڈروجن بانڈ (D) کو-آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ
- جب کیلشیم کلورین کے ساتھ ریٹ کرتا ہے تو بانڈ بنتا ہے:
(A) کو-آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ (B) ڈبل کوویلنٹ بانڈ (C) ٹریپل کوویلنٹ بانڈ (D) آئیونک بانڈ
- دو نائٹروجن ایٹمز مل کر نائٹروجن مالیکیول N_2 بناتے ہیں۔ ان کے درمیان بننے والا بانڈ کہلاتا ہے:
(A) ٹریپل کوویلنٹ بانڈ (B) ڈبل کوویلنٹ بانڈ (C) آئیونک بانڈ (D) متیلک بانڈ
- دو الیکٹرونز کے جوڑوں کے باہمی اشتراک سے بننے والا کیمیکیل بانڈ کہلاتا ہے:
(A) آئیونک بانڈ (B) ڈبل کوویلنٹ بانڈ (C) متیلک بانڈ (D) سنگل کوویلنٹ بانڈ
- سنگل کوویلنٹ بانڈ موجود ہوتا ہے:
(A) سوڈیم میٹل (B) آکسیجن گیس (C) میتھین (D) نائٹروجن
- کس بانڈ کو دو چھوٹی سیدھی لائنوں سے ظاہر کیا جاتا ہے؟
(A) آئیونک بانڈ (B) کو-آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ (C) ہائیڈروجن بانڈ (D) ڈبل کوویلنٹ بانڈ
- ایسا بانڈ جو میٹل ایٹمز کے درمیان موبائل الیکٹرونز کی وجہ سے تشکیل پاتا ہے کہلاتا ہے:
(A) متیلک بانڈ (B) آئیونک بانڈ (C) کو-آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ (D) ہائیڈروجن بانڈ
- جب الیکٹرونز کا بانڈ پھر صرف ایک انٹم دے تو ایسی بانڈ تک کہتے ہیں:
(A) کو-آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ (B) آئیونک بانڈ

(D) مثیلک بانڈ

(C) ڈبل کوویلنٹ بانڈ

-10 کس کیمیکل بانڈ کو عموماً تیر (←) سے ظاہر کیا جاتا ہے:

(A) آئیونک بانڈ (B) کوویلنٹ بانڈ (C) کوآرڈی ٹیٹ کوویلنٹ بانڈ (D) مثیلک بانڈ

جوابات

(C) -10	(A) -9	(A) -8	(C) -7	(C) -6	(B) -5	(A) -4	(D) -3	(B) -2	(A) -1
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

محکمہ تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے مختصر جوابی سوالات

ایٹمز کیمیکل بانڈ کیوں بناتے ہیں

3.1

کیمیکل بانڈ

3.2

□ مختصر جواب دیں۔

1- ایٹمز کیمیکل بانڈز کیوں بناتے ہیں؟

جواب: ایٹمز اپنے بیرونی شیل کو مکمل کرنے اور استحکام حاصل کرنے کے لیے کیمیکل بانڈز بناتے ہیں۔

2- کیمیکل بانڈ کی تعریف لکھیں۔

جواب: کیمیکل ایٹمز کے درمیان عمل کرنے والی ایسی فورس جو انہیں ایک مالیکیول میں جوڑے رکھتی ہے۔ کیمیکل بانڈ کہلاتی ہے۔

3- آئیونک بانڈ سے کیا مراد ہے؟

جواب: کیمیکل بانڈ جو ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں الیکٹرون کی مکمل منتقلی کے نتیجے میں بنتا ہے۔ آئیونک بانڈ کہلاتا ہے۔

4- کون سے ایٹمز آئیونک بانڈز بناتے ہیں؟

جواب: میٹلز اور نان میٹلز آئیونک بانڈز بناتے ہیں۔

5- آئیونک کپاؤنڈز کی تین مثالیں لکھیں۔



جواب: آئیونک کپاؤنڈز میں NaBr , MgO , CaCl_2 شامل ہیں۔

6- نان میٹلوں میں کس قسم کا کیمیکل بانڈ موجود ہوتا ہے؟


جواب: نان میٹلوں میں کوویلنٹ بانڈ موجود ہوتا ہے۔

7- ٹریل کوویلنٹ بانڈ سے کیا مراد ہے اور اسے کیسے ظاہر کیا جاتا ہے؟

جواب: ٹریل کوویلنٹ بانڈ: جب بانڈ بنانے والا ہر ایٹم تین تین الیکٹرونز (جو اشتراک شدہ الیکٹرون کے 3 جوڑے) کے ملنے سے بنتا ہے ٹریل

کوویلنٹ بانڈ کہلاتا ہے۔ اس بانڈ کو تین چھوٹی لائنوں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ($\equiv$)8- SiH_4 اور PCl_3 کی ڈاٹ اور کراس ڈایا گرام بنائیں۔

- 9- ڈبل کوویلنٹ بانڈ سے کیا مراد ہے؟
جواب: جب ہر بانڈ بنانے والا ایٹم دو دو الیکٹرونز فراہم کرتا ہے تو دو عدد بانڈ پیئر کی شراکت بنتی ہے اور ایک ڈبل کوویلنٹ بانڈ وجود میں آتا ہے۔
- 10- ڈبل کوویلنٹ بانڈ کی دو مثالیں دیں۔
جواب: کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آتھین میں ڈبل کوویلنٹ بانڈ ہوتا ہے۔
- 11- مندرجہ ذیل کی ڈاٹ اور کراس ڈیاگرام بنائیں۔ SO_2 (i) SO_3 (ii)
جواب: SO_2 :



- 12- آئیونک کپاؤنڈز سے کیا مراد ہے؟
جواب: وہ کپاؤنڈز جن میں آئیونک بانڈ ہوتا ہے انہیں آئیونک کپاؤنڈز کہتے ہیں۔ مثلاً MgO
- 13- کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کی تعریف لکھیں۔ اسے کیسے ظاہر کیا جاتا ہے؟
جواب: کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ: کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈنگ ایسی بانڈنگ ہے جس میں الیکٹرونز کا بانڈ پیئر صرف ایک ایٹم دیتا ہے۔
کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کو ظاہر کرنے کے لیے عموماً ایک (→) تیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔
- 14- کوویلنٹ اور کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ میں کیا فرق ہے؟
جواب: کوویلنٹ بانڈ الیکٹرونز کے باہمی اشتراک سے وجود میں آتا ہے جبکہ جب الیکٹرونز کا بانڈ پیئر صرف ایک ایٹم فراہم کرتا ہے تو کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بنتا ہے۔ بننے کے بعد کوویلنٹ اور کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

3.3 مٹیلک بانڈ

- 15- مٹیلک بانڈ سے کیا مراد ہے؟
جواب: مٹیلک بانڈ: مٹیلک بانڈ ایک ایسا بانڈ ہے جو پوزیٹو چارج والے مٹیل ایٹمز اور نیگیٹو چارج والے موبائل الیکٹرونز سے درمیان بنتا ہے۔
- 16- کس قسم کے ایلیمنٹس مٹیلک بانڈ بناتے ہیں؟
جواب: مٹیلو مٹیلک بانڈ بناتے ہیں۔
- 17- مٹیلک بانڈ کی مضبوطی کن عوامل پر منحصر ہے؟
جواب: مٹیلک بانڈ کی مضبوطی دو عوامل پر منحصر ہے:
- (i) پازٹیو آئنز پر موجود پازٹیو چارجز کی تعداد۔
(ii) ہر ایٹم کے ذریعہ آزاد کیے گئے موبائل الیکٹرونز کی تعداد۔
- 18- مٹیلو الیکٹریسیٹی کی اچھے کنڈکٹرز کیوں ہوتی ہیں؟
جواب: مٹیلو میں فری الیکٹرونز آزادانہ حرکت کر سکتے ہیں اس وجہ سے مٹیلو الیکٹریسیٹی کی اچھی کنڈکٹرز ہیں۔
- 19- سوڈیم یا میگنیشیم میں سے کونسی مٹیلو مٹیلک بانڈ مضبوط ہوتے ہیں؟
جواب: سوڈیم کی نسبت میگنیشیم میں مٹیلک بانڈ مضبوط ہوتے ہیں۔

3.4	میٹلوک کا الیکٹروپازیتو کرکٹر
3.5	نان میٹلوک کا الیکٹرو نیگیو کرکٹر
3.6	آئیونک اور کوویلنٹ کپاؤنڈ کی خصوصیات کا موازنہ

20- کیا ان سے کیا مراد ہے؟ دو مثالیں دیں۔

جواب: کیا ان: پازیتو چارج شدہ میٹل آئنز کو کیا ان کہلاتے ہیں۔

مثالیں: Mg^{2+} , Na^{+} وغیرہ۔

21- اینائن سے کیا مراد ہے؟ دو مثالیں دیں۔

جواب: اینائن: نیگیو چارج شدہ نان۔ میٹلک آئنز اینائن کہلاتے ہیں۔

مثالیں: O_2^{-} , Cl^{-} وغیرہ۔

22- کس قسم کے ایلمنٹس کیا انز بناتے ہیں؟

جواب: میٹلوک کیا انز بناتی ہیں۔

23- کس قسم کے ایلمنٹس اینائنز بناتے ہیں؟

جواب: نان میٹلوک اینائنز بناتی ہیں۔

24- الکلائن ارتھ میٹلوک کی کوئی سی دو مثالیں دیں۔

جواب: میکینیشیم (Mg)، کیلشیم (Ca) الکلائن ارتھ میٹلوک ہیں۔

25- الکلائن ارتھ میٹلوک کی میٹلوک سے کم ری ایکٹیو کیوں ہیں؟

جواب: الکلائن ارتھ میٹلوک کی میٹلوک کی نسبت کم ری ایکٹیو ہوتی ہیں۔ کیونکہ الکلائن ارتھ میٹلوک اپنے بیرونی الیکٹرون کو الکی میٹلوک کی نسبت کم آسانی سے

خارج کرتی ہیں۔

26- پیریاڈک ٹیبل کے سب سے زیادہ الیکٹرو نیگیو ایلمنٹ کا نام لکھیں۔

جواب: فلورین پیریاڈک ٹیبل کا سب سے زیادہ الیکٹرو نیگیو ایلمنٹ ہے۔

27- جب الیکٹروپازیتو اور الیکٹرو نیگیو ایلمنٹ ملتے ہیں تو کونسا بانڈ بنتا ہے؟

جواب: جب الیکٹروپازیتو اور الیکٹرو نیگیو ایلمنٹ ملتے ہیں تو آئیونک بانڈ بنتا ہے۔

28- تین سب سے زیادہ الیکٹرو نیگیو ایلمنٹس کے نام لکھیں۔

جواب: فلورین، آکسیجن، نائٹروجن سب سے زیادہ الیکٹرو نیگیو ایلمنٹس ہیں۔

کشش کی انٹرمالیکولیوئر

3.7

29- آئیونک کپاؤنڈز کی سولویٹیلیٹی سے کیا مراد ہے؟

جواب: آئیونک کپاؤنڈز عام طور پر پولر سولویٹس جیسے کہ پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں۔

30- دوسولویٹس کے نام لکھیں جن میں کوویلنٹ کپاؤنڈ حل پذیر ہوتے ہیں۔


جواب: کوویلنٹ کپاؤنڈز عام طور پر نان۔ پولر سولویٹس میں حل پذیر ہوتے ہیں جیسے کہ ہیزین اور ایسیٹون وغیرہ۔

31- انٹرمالیکولیور فورسز سے کیا مراد ہے؟ ان کی اقسام کے نام لکھیں۔
جواب: ایک کپاؤنڈ میں ایٹمز کو اکٹھا رکھنے والی فورسز کو بانڈ کہا جاتا ہے۔ بانڈ بنانے والی ان طاقتور فورسز کے ساتھ ساتھ مالیکیولز کے درمیان نسبتاً کمزور فورسز بھی پائی جاتی ہیں۔ جو انٹرمالیکولیور فورسز کہلاتی ہیں۔

اقسام: (i) ڈائی پول۔ ڈائی پول انٹرایکشن (ii) ہائیڈروجن بانڈنگ
32- طبعی خصوصیات پر انٹرمالیکولیور فورسز کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟

جواب: انٹرمالیکولیور فورسز مادے کی طبعی خصوصیات کو متاثر کرتی ہیں۔ مادوں کے میلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس کا انحصار ان فورسز پر ہوتا ہے۔ مائع کے مالیکیولز کے درمیان یہ فورسز جتنی مضبوط ہوں گی ان کا بوائلنگ پوائنٹ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اسی طرح، ٹھوس کے مالیکیولز میں انٹرمالیکولیور فورسز جتنی مضبوط ہوں گی ان کا میلنگ پوائنٹ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔

33- HCl مالیکیولز کے درمیان ڈائی پول۔ ڈائی پول فورسز کی مثال دیں۔



ڈائی پول۔ ڈائی پول انٹرایکشن


34- ٹھوس شکل میں آئیونک کپاؤنڈز سے الیکٹریسٹی کیوں نہیں گزرتی؟

جواب: ٹھوس شکل میں آئیونک کپاؤنڈز سے الیکٹریسٹی نہیں گزرتی کیونکہ ان کے آئنز مضبوطی سے جکڑے ہوتے ہیں اور حرکت نہیں کر سکتے۔
35- ایکوئس اور مولٹن فورم میں آئیونک کپاؤنڈز الیکٹریسٹی کے اچھے کنڈکٹرز کیسے ہیں؟

جواب: ایکوئس اور مولٹن فورم میں آئیونک کپاؤنڈز الیکٹریسٹی کے اچھے کنڈکٹرز ہیں کیونکہ ان کے آئنز اپنے متعلقہ الیکٹروڈز کی طرف جانے کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔

36- جب سوڈیم کلورائیڈ کا ایکوئس سلوشن سلورناٹریٹ کے ایکوئس سلوشن کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے تو کیا بنتا ہے؟

جواب: جب سوڈیم کلورائیڈ کا ایکوئس سلوشن سلورناٹریٹ کے ایکوئس سلوشن کے ساتھ ملتا ہے تو $AgCl$ کا سفید پریسیپیٹ بنتا ہے۔



white precipitate

37- کوئلے کا ایک استعمال لکھیں۔

جواب: کوئلہ بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس میں بطور ایندھن استعمال ہوتا ہے۔

38- دوبائٹری کوویلنٹ کپاؤنڈز کے نام اور فارمولہ لکھیں جو روم ٹمپریچر پر گیسز ہیں؟

جواب: نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ NO_2 ہائیڈروجن کلورائیڈ HCl

39- کاربن کی ایک کرسٹلائن اور ایک ایسورس فارم کا نام لکھیں۔

جواب: کرسٹلائن: ڈائمنڈ ایسورس: کوئلہ

مختصر جوابی کنسپیکٹوئل (Conceptual) سوالات


□ مختصر جواب دیں۔

1- ایٹمز اپنی انرجی کم کیوں کرتے ہیں؟

جواب: ایٹمز اپنی انرجی استحکام حاصل کرنے کے لیے کم کرتے ہیں۔

2- میتھین (CH_4) کے ڈاٹ اور کراس ساخت کی ڈایا گرام بنائیں۔

جواب: CH_4



3- میٹلز میں سے الیکٹریسیٹی کیوں گزرتی ہے؟

جواب: موبائل الیکٹرونز کی وجہ سے میٹلز میں سے الیکٹریسیٹی گزرتی ہے۔


4- آئیونک بانڈ کو ویلنٹ بانڈ سے مختلف کیوں ہے؟

جواب:

آئیونک بانڈ	کوویلنٹ بانڈ
ایسا کیمیکل بانڈ جو ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں الیکٹرون کی مکمل منتقلی کے نتیجے میں بنتا ہے آئیونک بانڈ کہلاتا ہے۔ یہ میٹلز اور نان میٹلز کے درمیان بنتا ہے۔	ایسا کیمیکل بانڈ جو الیکٹرونز کے باہمی اشتراک کی وجہ سے بنتا ہے کوویلنٹ بانڈ کہلاتا ہے۔ یہ نان میٹلز میں بنتا ہے۔

5- PCl_3 کی ڈاٹ اور کراس ڈایا گرام بنائیں۔

جواب: PCl_3



6- کونسے کمپاؤنڈز کو آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ بناتے ہیں؟

جواب: لون پیئر کے حامل کمپاؤنڈز جو کہ دوسرے مالیکیول کے ایٹم کو لون پیئر دے دیتے ہیں کو آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ بناتے ہیں۔

7- کونسے کمپاؤنڈز کو آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ بنانے کے قابل نہیں ہوتے؟

جواب: وہ کمپاؤنڈز جس میں الیکٹرون کے لون پیئر دینے والا ایٹم موجود نہ ہو کو آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ بنانے کے قابل نہیں ہوتے۔

8- میٹلک بانڈ اور آئیونک بانڈ کے درمیان فرق کریں۔

جواب: میٹلک بانڈ: پازیٹیو چارج والے میٹل ایٹمز اور نیگیٹیو چارج والے موبائل الیکٹرونز کے درمیان کشش کی قوت میٹلک بانڈ کہلاتی ہے۔

آئیونک بانڈ: ایسا بانڈ جو ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں الیکٹرون کی مکمل منتقلی سے وجود میں آتا ہے۔ آئیونک بانڈ کہلاتا ہے۔

اہم نکات :-

1- ایٹمز ڈولپٹ اور آکلیٹ قوانین کے مطابق اپنے استحکام کی خاطر دوسرے ایٹمز کے ساتھ کیمیائی بانڈز بناتے ہیں۔

2- کشش کی وہ قوت جو ایٹمز کو جوڑے رکھتی ہے کیمیائی بانڈ کہلاتی ہے۔

3- الیکٹرون یا الیکٹرونز کے تبادلہ سے وجود میں آنے والا بانڈ آئیونک بانڈ کہلاتا ہے۔

4- کوویلنٹ بانڈ ایٹمز کے درمیان الیکٹرونز کی باہمی شیئرنگ سے بنتا ہے۔ کوویلنٹ بانڈز سنگل، ڈبل اور ٹریپل ہو سکتے ہیں۔

- 5- جب کوویلنٹ بانڈ دو ایک جیسے ایٹمز کے درمیان بنتا ہے تو اسے نان پولر کوویلنٹ بانڈ کہتے ہیں۔
- 6- جب کوویلنٹ بانڈ دو مختلف ایٹمز کے درمیان بنے جن کی الیکٹرو نیگیٹیو ویلیوز میں فرق ہو تو اس کو پولر کوویلنٹ بانڈ کہتے ہیں۔
- 7- جب دو ایٹمز کے درمیان بننے والا الیکٹرونی جوڑا ایک ہی ایٹم مہیا کرے تو اس کو کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کہتے ہیں۔
- 8- مالیکولز کے درمیان کشش کی قوتیں دو قسم کی ہیں ایک ڈائی پول، ڈائی پول کشش اور دوسری ہائیڈروجن بانڈنگ۔
- 9- ٹھوس آئیونک کمپاؤنڈز عام طور پر کرسٹلائن ہوتے ہیں اور ان کے میلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس زیادہ ہوتے ہیں یہ کمپاؤنڈز عام طور پر پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔
- 10- کم ماس رکھنے والے کوویلنٹ کمپاؤنڈز عام طور پر گیسوں یا کم بوائلنگ پوائنٹ رکھنے والے مائع ہوتے ہیں جبکہ زیادہ ماس رکھنے والے کمپاؤنڈز زیادہ تر ٹھوس ہیں۔ یہ بجلی کے نان کنڈکٹر ہیں اور اریکنک سالوں میں حل ہو جاتے ہیں۔
- 11- آئیونک اور کوویلنٹ بانڈز کے خواص کا انحصار اس بات پر ہے کہ ان کے ذرات کے درمیان کس قسم کی کشش کی قوت موجود ہے۔

حل مشقی سوالات

- 1- صحیح جواب پرنگ (✓) کریں۔
- (i) جب پچھلے ہوئے کا پر اور پچھلے ہوئے رنگ کو ملایا جاتا ہے تو براس (Brass) نام کی نئی شے بنتی ہے۔ بتائیں کہ اس میں کا پر اور رنگ کے درمیان کس قسم کا بانڈ وجود میں آئے گا؟
- (الف) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ
(ب) آئیونک بانڈ
(ج) میٹلک بانڈ
(د) کوویلنٹ بانڈ
- (ii) کونسا ایلمنٹ تینوں یعنی آئیونک، کوویلنٹ اور کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈز بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے؟
- (الف) کاربن
(ب) آکسیجن
(ج) میگنیشیم
(د) سیلیکون
- (iii) پانی کیوں مائع ہے اور ہائیڈروجن سلفائیڈ کیوں گیس ہے؟
- (الف) کیونکہ پانی میں آکسیجن کا اٹامک سائز سلفر سے بہت چھوٹا ہے
(ب) کیونکہ پانی ایک پولر کمپاؤنڈ ہے اور اس کے مالیکولز کے درمیان کشش کی مضبوط قوتیں موجود ہیں
(ج) کیونکہ پانی ہائیڈروجن سلفائیڈ سے ہلکا ہے۔
(د) کیونکہ پانی آسانی سے منجمد ہو کر برف بنا دیتا ہے۔
- (iv) ذیل میں سے درج بانڈز میں سے کون سا بانڈ سب سے کمزور تصور ہوتا ہے؟
- (الف) C-C
(ب) Cl-Cl
(ج) O-O
(د) F-F
- (v) کاربن کی کون سی فارم کو لبریکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟
- (الف) کوئلہ
(ب) ہیرا
(ج) گریفائیٹ
(د) چارکول
- (vi) مالیکولز کے درمیان کشش کی قوتوں کی مضبوطی کو مد نظر رکھ کر بتائیں کہ کون سے کمپاؤنڈ کا بوائلنگ پوائنٹ سب سے زیادہ ہوگا؟
- (الف) H_2S
(ب) H_2O
(ج) HF
(د) NH_3
- (vii) کس میٹل کا میلنگ پوائنٹ سب سے زیادہ ہوگا؟
- (الف) Li
(ب) Na
(ج) K
(د) Rb

(viii) کس آئیونک کمپاؤنڈ کا میلنگ پوائنٹ سب سے زیادہ ہوگا؟

(الف) NaCl (ب) KCl (ج) LiCl (د) RbCl

(ix) کس کمپاؤنڈ میں کوویلنٹ بانڈ اور آئیونک بانڈ دونوں موجود ہیں؟

(الف) $MgCl_2$ (ب) NH_4Cl (ج) CaO (د) PCl_3

(x) درج ذیل میں سے کس میں ڈبل کوویلنٹ بانڈ ہے؟

(الف) ایتھین (Ethane) (ب) میتھین (Methane) (ج) ایتھیلین (Ethylene) (د) ایسٹیلین (Acetylene)

سوالات

1- (ج)	2- (ب)	3- (ب)	4- (د)	5- (ج)	6- (ب)	7- (د)	8- (الف)	9- (ب)	10- (ج)
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------

2- مختصر سوالات:

(i) کس قسم کے الیکٹرون اپنے بیرونی شیل میں موجود الیکٹرون کو آسانی سے کھو دیتے ہیں اور کس قسم کے الیکٹرون اپنے بیرونی شیل میں الیکٹرون جذب کر لیتے ہیں؟

جواب: میٹلز آسانی سے اپنے بیرونی الیکٹرونز خارج کر سکتے ہیں جبکہ نان میٹلز آسانی سے الیکٹرونز حاصل کرتے ہیں۔

(ii) کم ماس رکھنے والے کوویلنٹ کمپاؤنڈز کیوں گیس یا کم بوائٹنگ پوائنٹ والے مائع کی طرح پائے جاتے ہیں؟

جواب: لوئر مالیکیولر ماس کوویلنٹ کمپاؤنڈز اپنے مالیکیولز کے درمیان کشش کی کمزور فورسز کی وجہ سے گیسز یا کم بوائٹنگ لیکوڈز کے طور پر موجود ہیں۔

(iii) ایسے کسی الیکٹرون کی مثال دیں جو کرسٹلائن ٹھوس کی طرح پایا جاتا ہے اور اس کے ایٹمز کے درمیان کوویلنٹ بانڈز ہیں؟

جواب: کاربن (ڈائمنڈ) کرسٹلائن ٹھوس کے طور پر پایا جاتا ہے اور اس کے ایٹمز کے درمیان کوویلنٹ بانڈ موجود ہوتا ہے۔


(iv) میٹلو کی کون سی خصوصیت کی وجہ سے ان کو تاروں اور چادروں میں تبدیل کیا جاسکتا ہے؟

جواب: جب میٹلز پر پریشر ڈالا جاتا ہے، تو ایٹمز کی اوپر قطاریں نیچے کی قطاروں سے پھسل جاتی ہیں اس کے نتیجے میں ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے میٹلز کو کھینچ کر تاروں اور چادروں کی شکل دی جاسکتی ہے۔ میٹلو کی یہ خاصیت انہیں میلبل اور ڈکٹائل بناتی ہے۔

(v) کیا کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ ایک مضبوط بانڈ ہے؟

جواب: جب الیکٹرونز کا بانڈ پیئر صرف ایک ایٹم دیتا ہے۔ تو کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بنتا ہے۔ کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ مضبوط بانڈ ہے لیکن دوسرے کوویلنٹ بانڈز کی طرح مضبوط نہیں ہے۔

(vi) نائٹرک ایسڈ (HNO_3) کا ڈاٹ اور کراس سٹرکچر لکھیں۔



3- تعمیری فکر پر مبنی سوالات (Constructed Response Questions)

(i) HF ایک مائع ہے اور HCl ایک گیس۔ ایسا کیوں ہے؟

جواب: HF روم ٹمپریچر پر مائع ہے جبکہ HCl گیس ہے کیونکہ HF میں HCl کی نسبت ہائیڈروجن بانڈنگ مضبوط ہوتی ہے۔

(ii) کوویلنٹ کمپاؤنڈز عام طور پر پانی میں کیوں حل نہیں ہوتے؟

جواب: کوویلنٹ کمپاؤنڈز عام طور پر پانی میں حل پذیر نہیں ہوتے کیونکہ زیادہ تر کوویلنٹ کمپاؤنڈز نان پولر ہیں جبکہ پانی پولر ہے۔

(iii) مطلق حرارت کی کنڈکٹریس ہیں؟

جواب: آزادانہ الیکٹرونز کی موجودگی کی وجہ سے میٹلز ہیٹ اور الیکٹریسیٹی کی اچھی کنڈکٹرز ہیں۔

(iv) نائٹروجن کتنی قسم کے آکسائیڈز بناتی ہے؟ ان آکسائیڈز کے فارمولے لکھیں۔

جواب: نائٹروجن سے پانچ آکسائیڈز بنتے ہیں۔

آکسائیڈ کا فارمولا:

1- ڈائی نائٹروجن آکسائیڈ (نائٹرس آکسائیڈ) N_2O

2- نائٹروجن آکسائیڈ (نائٹریک آکسائیڈ) NO


3- ڈائی نائٹروجن ٹرائی آکسائیڈ (نائٹرس این ہائیڈرائیڈ) N_2O_3

4- نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ (نائٹروجن پراکسائیڈ) NO_2

5- ڈائی نائٹروجن آکسائیڈ (نائٹریک این ہائیڈرائیڈ) N_2O_5

(v) سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کو پانی میں اگر سلور نائٹریٹ سے ملا یا جائے گا تو کیا ہوگا؟

جواب: $NaBr$ جب $AgNO_3$ کے ساتھ ریکٹ کرتی ہے تو $AgBr$ کی کریپی PPT بنتی ہے۔



(vi) آئیوڈین ایک ٹھوس جبکہ کلورین ایک گیس کے طور پر کیوں پائی جاتی ہیں؟

جواب: آئیوڈین ایک ٹھوس جبکہ کلورین گیس ہے کیونکہ آئیوڈین کے مالیکولز بڑے ہوتے ہیں اور ان میں زیادہ الیکٹرون ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آئیوڈین کے مالیکولز کے درمیان مضبوط انٹر مالیکولر فورسز موجود ہوتی ہیں، جو کہ آئیوڈین کو روم ٹمپریچر پر ٹھوس بناتی ہیں۔ جبکہ کلورین میں چھوٹے سائز کی وجہ سے انٹر مالیکولر فورسز کمزور ہوتی ہیں اس لیے کلورین روم ٹمپریچر پر گیس ہے۔

4- تفصیلی سوالات

(i) آئیونک اور کوویلنٹ بانڈز کیسے بنتے ہیں؟ تفصیل سے لکھیں۔

جواب: دیکھیے سوال نمبر 6 اور 8

(ii) سوڈیم کلورائیڈ کی کرشل بنانے کے لیے اس میں موجود آئنز کس طرح خود کو ترتیب دیتے ہیں؟

جواب: دیکھیے سوال نمبر 07

(iii) میٹلک بانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے میٹلو کی خصوصیات کی وضاحت کریں۔

جواب: دیکھیے سوال نمبر 15

(iv) آئیونک اور کوویلنٹ کمپاؤنڈز کی خصوصیات کا تقابلی جائزہ لیں۔

جواب: دیکھیے سوال نمبر 18

(v) گریفائٹ کرشل بجلی کا کنڈکٹر ہے اس کے شرکاء کی مدد سے اس بات کی وضاحت کریں؟


جواب: گریفائٹ ایک تہہ دار ساخت پر مشتمل ہوتا ہے جو کاربن کے ہیکساگونل رنجز سے بنا ہوتا ہے۔ چونکہ ہمیں ایک دوسرے سے جکڑی نہیں ہوتیں اس لیے ایک دوسرے سے پھسل سکتی ہیں۔ صنعت میں گریفائٹ کو لبری کینٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید برآں، گریفائٹ میں ان تہوں کے درمیان موبائل الیکٹرونز ہوتے ہیں۔ گریفائٹ بجلی کا ایک اچھا کنڈکٹر ہے اور اسے الیکٹروڈ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

(vi) میٹلز عام طور پر بھاری اور سخت کیوں ہوتی ہیں؟
 جواب: میٹلز عام طور پر سخت اور بھاری ہوتی ہیں کیونکہ میٹلز میں ایٹم مضبوطی سے جکڑے ہوتے ہیں اور قطاروں کی شکل میں ایک دوسرے کے اوپر ترتیب دیے جاتے ہیں۔ یہ ترتیب انھیں سخت اور بھاری بناتی ہے۔

تحقیقی سوالات (Investigative Questions) -5

(i) کیسی حالت میں $AlCl_3$ ڈائی مر (Dimer) کے طور پر پایا جاتا ہے اور اس کا فارمولا Al_2Cl_6 ہے۔ اس ڈائی مر میں موجود مالکیولز کے درمیان کس قسم کا بانڈ ہوتا ہے؟

جواب: اس ڈائی مر میں آرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ پایا جاتا ہے۔



(ii) ریت (SiO_2) کی ساخت کی وضاحت کریں۔

جواب: SiO_2 کو سیلیکا بھی کہتے ہیں۔ SiO_2 میں ہر سیلیکون ایٹم کو چار آکسیجن ایٹم کے ساتھ ٹیٹراہیڈرل طور پر جوڑا جاتا ہے اور ہر آکسیجن ایٹم صرف دو سیلیکون ایٹمز سے منسلک ہوتا ہے۔

